



## Diferencias generales entre la Demencia con cuerpos de Lewy, el Alzheimer y el Parkinson

Este cuadro se basa en nuestras experiencias como cuidadores de personas con demencia con cuerpos de Lewy (LBD). La información pretende ser una guía para ayudar a reconocer los síntomas antes y evitar diagnósticos erróneos. Esto no pretende diagnosticar a ninguna persona en particular, sino simplemente servir como una guía informativa. Además, muchas personas tienen patologías mixtas y hay superposición clínica.

Por favor, asegúrese de consultar con un neurólogo.

ENFERMEDAD	PERDIDA DE MEMORIA	OTROS SÍNTOMAS COGNITIVOS <i>(planificación, falta de juicio, resolución problemas, múltiples tareas)</i>	FLUCTUACIONES en Estado de Alerta y Atención <i>(A diario o día a día)</i>	PROBLEMAS DE MOVIMIENTO <i>(lentitud, rigidez, marcha arrastrando los pies, problema de equilibrio)</i>	ALUCINACIONES Y DELIRIO <i>(personas, animales, objetos)</i>	PROBLEMAS DE SUEÑO <i>(trastorno REM, síndrome de piernas inquietas, sueño interrumpido, somnolencia diurna)</i>	SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO <i>(hipotensión ortostática, incontinencia urinaria)</i>	SENSIBILIDAD A MEDICAMENTOS
<b>DEMENCIA CON CUERPOS DE LEWY</b>	A MEDIO PLAZO	TEMPRANOS	TEMPRANO A MEDIO PLAZO	TEMPRANOS	TEMPRANAS	TEMPRANO (REM o RLS)	A MEDIO PLAZO	GENERALMENTE SI
<b>ALZHEIMER</b>	TEMPRANA	A MEDIO PLAZO	A LARGO PLAZO	A LARGO PLAZO (balance)	DE MEDIO A LARGO PLAZO	TEMPRANO A MEDIO PLAZO	A LARGO PLAZO	GENERALMENTE NO
<b>PARKINSON</b>	A LARGO PLAZO	A LARGO PLAZO	GENERALMENTE NO	TEMPRANOS	DE MEDIO A LARGO PLAZO	TEMPRANO (REM o RLS)	DE MEDIO A LARGO PLAZO	GENERALMENTE NO

### Información importante sobre la demencia con cuerpos de Lewy (LBD):

- LBD es un término general que se refiere a dos diagnósticos: Demencia con cuerpos de Lewy (LBD) y demencia por enfermedad de Parkinson (PDD). Aunque los criterios de diagnóstico para DLB y PDD difieren, los síntomas asociados son en gran medida los mismos.
- Una persona con LBD generalmente mostrará una disminución continua en el pensamiento, fluctuaciones en el estado de alerta y problemas de movimiento (signos de parkinsonismo).
- Algunas personas mostrarán síntomas de problemas cognitivos y de movimiento durante el primer año. Otros pueden tener dificultad con el movimiento primero y demencia mucho más tarde, lo que es más indicativo de la demencia de la enfermedad de Parkinson (PDD).
- Las alucinaciones y la identificación errónea de personas y objetos son mucho más típicas en LBD.
- El trastorno del sueño REM o el síndrome de piernas inquietas pueden ser signos muy tempranos de LBD.
- Las personas con LBD tienden a ser muy sensibles a los medicamentos y, a veces, tienen una reacción paradójica.
- Las fluctuaciones son muy comunes. A veces, las personas tienden a estar más alertas y despiertas, mientras que otras veces están más confundidas, sedadas o irritables.